

## CESAREAS MULTIPLES

**Pregunta:** ¿ Es real que no se pueden hacer muchas cesáreas a la mujer ya que los tejidos se hacen más débiles y el embarazo es de alto riesgo para la madre y el niño ?.

Es cierto que con cada cesárea se debilitan los tejidos tanto de la piel como del útero con la consiguiente posibilidad de dehiscencia y/o ruptura uterina (aunque poco probable). A mayor número de cicatrices en el útero, mayor es su debilidad y menor su tolerancia a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto.

Por otro lado las cesáreas anteriores realizadas con incisión vertical son de mayor riesgo para intentar un parto vaginal.

Por todo ello los antecedentes de cesárea repetidas, hacen que el embarazo sea de alto riesgo y lo recomendable con más de 2 cesáreas anteriores es realizar una nueva cesárea. Debe considerarse también el tiempo entre la última cesárea y el nacimiento actual. Se considera que por lo menos deben haber pasado 2 años, para disminuir dicho riesgo.

La prueba de un parto vaginal podría ser admitida si el trabajo d parto fuese de comienzo espontáneo y el embarazo de post-término, pero nunca se debe realizar una inducción del mismo.

En todos los casos se debe conversar con el profesional que la atiende considerando los riesgos de esta intervención y de sus ventajas. Ellos tienen la última palabra.

Atentamente por "nacerlatinoamericano"

Dr. Eduardo Paquez