

## Hay 39,5 millones de personas con VIH/sida

Pese a algunas leves mejorías, la pandemia se sigue expandiendo. La mitad sur de África aún tiene las cifras más dramáticas, pero Asia y Europa del Este van rumbo a convertirse en nuevos focos

A pesar de algunos avances aislados, la epidemia mundial del sida alcanzó un nuevo récord con 39,5 millones de infectados, de los cuales 4,3 millones se han expuesto al virus VIH en este año, según el informe mundial 2006 presentado en Ginebra por Onusida. La versión actualizada del informe indica que 2,9 millones de personas murieron de sida.

Como en años anteriores, África subsahariana es la región más afectada por el virus de inmunodeficiencia humana: allí viven casi dos tercios de todos los infectados (63%). Si bien el porcentaje de afectados se redujo en algunos países, la tendencia sigue siendo fuerte y amplia como para debilitar la epidemia. Casi tres cuartos (72%) de todas las muertes por sida ocurren en el sur de África (2,1 millones).

El mayor aumento de infecciones con VIH se registra en Asia Central y Oriental y Europa del Este. Allí hubo en 2006 cerca de un quinto (21%) más infectados que en 2004.

En el mundo, según el organismo de la ONU para la vigilancia de la epidemia, sólo un cuarto de los 6,8 millones de infectados recibe medicación, los llamados antirretrovirales. Sobre todo falta dinero en la lucha contra el sida: este año hay a disposición \$us 8.900 millones para todo el mundo, cuando en realidad se necesitan \$us 14.900 millones.

Si se implementaran los métodos de tratamiento y prevención existentes, se evitarían hasta 2020 unas 29 millones de nuevas infecciones. Esto significaría un ahorro de \$us 24.000 millones en costos de tratamiento hasta 2015.

En Asia, la segunda región más afectada, viven 8,6 millones de personas con VIH/sida. En la India hay 5,7 millones de infectados, por lo que junto con Sudáfrica (5,5 millones) es el país con más afectados. Cada vez más mujeres indias contraen el virus porque sus maridos se infectan teniendo sexo con prostitutas. En Bombay, el 54% de las prostitutas tiene VIH. En China, el 44% de los 650.000 infectados contrajo el virus por jeringas infectadas para inyectarse droga.

En América Latina, 1,7 millones de personas están infectadas con el VIH, de las cuales 140.000 lo contrajeron en 2006. Un total de 65.000 personas murió este año en la región a causa de la enfermedad.

Según la ONU, que cree que con menos 'homofobia' y más programas específicos para los hombres que tienen relaciones homosexuales se podría mejorar la situación de la epidemia en el continente.

En los países ricos de Europa Occidental y Central así como en Estados Unidos viven en total 2,1 millones de infectados con VIH, y unos 65.000 contrajeron el virus en 2006. Una causa por la que el número de infectados no decrece es la creencia de que gracias a los nuevos medicamentos "el VIH ya no es una condena a muerte", dijo el director de Onusida, Bertil Lindblad.

Los responsables del informe valoraron que en la última década en muchos países con epidemias generalizadas se han producido cambios positivos en el comportamiento sexual de los jóvenes, que cada vez usan más el preservativo, retrasan el inicio sexual y tienen menos parejas diferentes.

### La homofobia aún tiene su costo en vidas

El número de nuevos casos de sida y de muertes a causa del VIH en Latinoamérica descendió ligeramente en el último año, según la ONU, que cree que con menos homofobia y más programas específicos para los hombres que tienen relaciones homosexuales se reducirían aún más esas cifras.

"Las relaciones sexuales entre varones y el comercio sexual parecen ser los principales factores de riesgo de infección por el VIH en Latinoamérica", aseguró en Ginebra el director general del Programa de la ONU para el Sida, Peter Poit.

Onusida afirma que 140.000 personas contrajeron el virus en la región este año frente a 200.000 en 2005, al tiempo que las muertes por esa enfermedad cayeron de 66.000 a 65.000.

Dos tercios de los 1,7 millones de personas que viven con el virus en la región (frente a los 1,8 de 2005) están en Argentina, Brasil, Colombia y México, pero la prevalencia es mayor en Centroamérica. Pese a la relativa mejoría, se están detectando brotes del virus entre consumidores de drogas intravenosas y entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

El informe atribuye la expansión del virus en la región a "factores comunes en los países latinoamericanos", como la pobreza y la falta de información sobre tendencias de la pandemia fuera de las ciudades, pero también a una 'homofobia galopante'.

Fuente: OPS

<http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=11342&SE=SN>